高二 数学学科 拓展资源 7 《集合新定义问题研究》学习指南

学习目标

- 1.通过对习题的探究解决，理解集合中的新定义问题的解决的一般思路；
- 2.在解决问题中，落实抽象概括，推理论证及其数学运算等核心素养；
- 3.在整个学习过程中，培养了对知识迁移能力和转化能力，激发了进一步学习的潜能，从而强化了创新的思维品质。

学法指导

- 1.关于解决集合新定义问题，我们常常采用以下解题思路：

- 2.这类问题解决的重点是：对信息的提取和转化及化归；（关注例 1 和例 2 给的新信息的应用）
- 3.这类问题能很好的考查出我们对知识迁移能力和转化能力，从而检测出我们的理性思维的广度和深度，以及进一步学习的潜能，从而培养我们的创新思维。

学习任务单

例 1. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k \in A$ ，如果 $k-1 \notin A$ 且 $k+1 \notin A$ ，那么 k 是 A 的一个“孤立元”，给定 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，则 A 的所有子集中，只有一个“孤立元”的集合共有（ ）

- A. 10 个 B. 11 个 C. 12 个 D. 13 个

解析：方法一：以“集合 A 的子集”中含有一个孤立元入手，进行分类处理

（1）集合 A 的子集中元素个数为 1 个

$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$

（2）集合 A 的子集中元素个数为 3 个

$\{1, 3, 4\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{2, 3, 5\}$

（3）集合 A 的子集中元素个数为 4 个

$\{1,3,4,5\}, \{1,2,3,5\}$

方法二：以“孤立元为谁”进行分类处理

(1) 元素“1”为孤立元, $\{1\}, \{1,3,4\}, \{1,4,5\}, \{1,3,4,5\}$

(2) 元素“2”为孤立元, $\{2\}, \{2,4,5\}$

(3) 元素“3”为孤立元, $\{3\}$

(4) 元素“4”为孤立元, $\{4\}, \{1,2,4\}$

(5) 元素“5”为孤立元, $\{5\}, \{1,2,5\}, \{2,3,5\}, \{1,2,3,5\}$

小结:

1. 本题只要抓住“孤立元”这个关键的新概念, 结合集合的子集概念, 利用分类讨论思想(并且根据分类标准的选择不同, 采用了两种不同的方法), 可以很快, 很轻松的解决。

2. 本题主要考查阅读与理解、信息迁移以及我们的学习潜力, 考查我们的分析问题和解决问题的能力, 实际上解题的关键还是“孤立元”的概念。

例 2. 对于集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}^*$, 定义

$A+B = \{x+y | x \in A, y \in B\}$. 集合 A 中的元素个数记为 $|A|$. 规定: 若集合 A 满足

$|A+A| = \frac{n(n+1)}{2}$, 则称集合具 A 有性质 T .

(1) 已知集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right\}$, 写出 $|A+A|$, $|B+B|$ 的值;

(2) 已知集合 $A = \left\{\frac{2}{3}, \left(\frac{2}{3}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^3, \dots, \left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}$, 其中 $n \geq 3$, 证明: A 有性质 T ;

(3) 已知集合 A, B 有性质 T , 且 $n=m$, 求 $|A+B|$ 的最小值.

解析: (1) 根据定义可得: $A+A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$,

$$B+B = \left\{\frac{2}{3}, 1, \frac{5}{3}, 3, \frac{4}{3}, 2, \frac{10}{3}, \frac{8}{3}, 4, \frac{16}{3}\right\}.$$

所以 $|A+A|=7, |B+B|=10$

(2) 数列 $\frac{2}{3}, \left(\frac{2}{3}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^3, \dots, \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 的通项公式为: $a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

若存在 $n_1 < n_2 \leq n_3 < n_4$, $a_{n_1} + a_{n_4} = a_{n_2} + a_{n_3}$ 成立, 则 $\left(\frac{2}{3}\right)^{n_1} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n_4} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n_2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n_3}$, 因此有

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{n_4-n_1} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n_2-n_1} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n_3-n_1} - 1, \text{ 即有 } 2^{n_4-n_1} = 2^{n_2-n_1} \times 3^{n_4-n_2} + 2^{n_3-n_1} \times 3^{n_4-n_3} - 3^{n_4-n_1}.$$

等式的左边是 2 的倍数, 右边是 3 的倍数, 故等式不成立, 因此等比数列中的任意两项(包括本身与本身)的和不在这个数列中

所以 $|A+A|$ 中的元素的个数为: $n+(n-1)+(n-2)+\dots+2+1 = \frac{n(n+1)}{2}$, 即

$$|A+A| = \frac{n(n+1)}{2}, \text{ 所以 } A \text{ 有性质 } T;$$

(3) 集合 A 具有性质 T , 所以集合 A 中的任意两个元素的和都不在该集合中, 也就是集合 A 中的任意两个元素的和都不相等, 对于任意的 $a < b \leq c < d$ 有 $a+d \neq b+c \Leftrightarrow d-c \neq b-a$, 也就是任意两个元素的差的绝对值不相等.

设 $A^* = \{x-y \mid x \in A, y \in A, x > y\}$, 所以

$$\text{集合 } A \text{ 具有性质 } T \Leftrightarrow |A+A| = \frac{n(n+1)}{2} \Leftrightarrow |A^*| = \frac{n(n-1)}{2},$$

集合 A, B 有性质 T , 且 $n = m$

$$|A+B| = n^2 - |A^* \cap B^*| \geq n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} \text{ (当且仅当 } A=B \text{ 时, 取等号).}$$

所以 $|A+B|$ 的最小值为 $\frac{n(n+1)}{2}$.

小结:

1. 本题的新体现在: 新的运算, 新的性质和与数列结合的综合创新问题, 所以属于难题.
2. 解决本题用到了等价转化思想方法, 反证法等, 更重要的需要学生在推理论证, 抽象概括, 数学运算等方面能力比较强, 所以体现此类题目综合性强的特点..
3. 我们解决这个问题, 还是抓住了利用题目新的信息, 结合已有的知识, 综合解决它.