高一数学第 47 课时平面向量复习（一）

学习目标

- 1: 掌握平面向量的概念、运算、平面向量基本定理、平面向量的数量积及其应用；
- 2: 用向量语言、方法表述解决问题，提升直观想象和数学运算素养，提高分析问题解决问题的能力；
- 3: 体会转化与数形结合等数学思想，增进对数学本质的理解；

学法指导:

向量既是几何研究对象，也是代数研究对象，是沟通几何与代数的桥梁，要在熟练掌握相关知识的同时注意转化与数形结合思想的应用；

一：复习回顾

1、向量运算：

(1) 加法运算 平行四边形法则，三角形法则，多边形法则，首尾相连首尾连；

(2) 减法运算 共起点，连终点，指向被减；

(3) 数乘运算律

$$\lambda(\mu\vec{a}) = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (\lambda\mu)\vec{a}$$

$$(\lambda + \mu)\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$$

$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$$

(4) 数量积与运算律 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$(\lambda\vec{a}) \cdot \vec{b} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}), \vec{a} \cdot (\lambda\vec{b})$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$$

2、坐标运算：

设 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2), \lambda \in \mathbb{R}$, 则

$$(1) \vec{a} + \vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

(2) $\vec{a} - \vec{b} =$ _____ ; $(x_1 - x_2, y_1 - y_2)$

(3) $\lambda \vec{a} =$ _____ ; $(\lambda x_1, \lambda y_1)$

(4) $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____ . $x_1 x_2 + y_1 y_2$

3、平面向量基本定理:

如果 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是同一平面内的两个不共线向量, 那么对于这一平面内的任一向量 $\vec{a}$, 有且只有一对实数 λ_1, λ_2 , 使 $\vec{a} =$ _____ ; $\lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$ 。

4、两个向量平行的充要条件:

(1) $\vec{a} // \vec{b}$ 的充要条件是: _____ ; (向量表示) $\vec{b} = \lambda \vec{a}, \vec{a} \neq \vec{0}$

(2) 若 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$,

则 $\vec{a} // \vec{b}$ 的充要条件是: _____ ; (坐标表示) $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$

5、两个非零向量垂直的充要条件:

(1) $\vec{a} \perp \vec{b}$ 的充要条件是: _____ ; (向量表示) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

(2) 若 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$,

则 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 的充要条件是: _____ ; (坐标表示) $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$

6、向量夹角公式

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

平面向量主要知识可概括为: 一个定理、两个条件、三种语言、四种运算

- (1) 平面向量基本定理;
- (2) 两个向量垂直、平行的条件;
- (3) 图形语言、符号语言、坐标语言 (代数语言);
- (4) 加法、减法, 实数与向量的积, 向量的数量积;

二: 例题精讲

例 1: 如图, 已知正六边形 $P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6$, 下列向量的数量积中最大的是 ()

- A. $\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot \overrightarrow{P_1 P_3}$
- B. $\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot \overrightarrow{P_1 P_4}$
- C. $\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot \overrightarrow{P_1 P_5}$
- D. $\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot \overrightarrow{P_1 P_6}$

解析：根据正六边形的几何性质.

$$\langle \overrightarrow{P_1P_2}, \overrightarrow{P_1P_3} \rangle = \frac{\pi}{6}, \quad \langle \overrightarrow{P_1P_2}, \overrightarrow{P_1P_4} \rangle = \frac{\pi}{3}, \quad \langle \overrightarrow{P_1P_2}, \overrightarrow{P_1P_5} \rangle = \frac{\pi}{2}, \quad \langle \overrightarrow{P_1P_2}, \overrightarrow{P_1P_6} \rangle = \frac{2\pi}{3}. \quad \therefore \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_6} < 0, \quad \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_5} = 0, \\ \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_3} > \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_4}, \quad \text{比较可知 A 正确.}$$

例 2：设 $x, y \in \mathbb{R}$ ，向量 $a = (x, 1), b = (1, y), c = (2, -4)$ 且 $\vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} // \vec{c}$ ，则 $|\vec{a} + \vec{b}|$

- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{10}$ (C) $2\sqrt{5}$ (D) 10

解析：因为 $\vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} // \vec{c}$ ，所以有 $2x - 4 = 0$ 且 $2y + 4 = 0$ ，解得 $x = 2, y = -2$ ，即 $\vec{a} = (2, 1), \vec{b} = (1, -2)$ ，所以 $\vec{a} + \vec{b} = (3, -1)$ ， $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{10}$ ，选 B.

例 3. 已知点 O 是平面上一定点， A, B, C 是平面上不共线的三个点，动点 P 满足：

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right), \quad \lambda \in [0, +\infty), \quad \text{则点 } P \text{ 的轨迹一定通过 } \triangle ABC \text{ 的 ()}.$$

- A. 外心 B. 内心 C. 重心 D. 垂心

解析：

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right), \quad \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \text{ 是与 } \overrightarrow{AB} \text{ 同方向的单位向量, 令 } \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \overrightarrow{AM}, \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} = \overrightarrow{AN},$$

则 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN})$ ，即 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{AE}$ ， $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AE}$ ，四边形 $AMEN$ 是菱形， AE 平分 $\angle MAN$ ，即 $\angle BAC$ ，点 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的内心. 答案：B

(1) 深化理解“向量”概念.

(2) 养成“数形结合”的思维习惯.

数形结合是处理向量问题的常用思想方法,数形结合的关键在于把握基本量的代数形式与几何特征之间的联系.如本题中由 $\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 看到单位向量.

例4. 已知 $|\mathbf{a}|=1$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2}$, $(\mathbf{a}-\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a}+\mathbf{b}) = \frac{1}{2}$, 求:

(1) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角; (2) $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 的夹角的余弦值.

解析: (1) $\because (\mathbf{a}-\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a}+\mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 1 - |\mathbf{b}|^2 = \frac{1}{2}$, $\therefore |\mathbf{b}|^2 = \frac{1}{2}$, $\therefore |\mathbf{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ ,

则 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{\frac{1}{2}}{1 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. $\because \theta \in [0^\circ, 180^\circ]$, $\therefore \theta = 45^\circ$.

(2) $\because |\mathbf{a}|=1$, $|\mathbf{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore |\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2 = \mathbf{a}^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b}^2 = 1 - 2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

$\therefore |\mathbf{a}-\mathbf{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 又 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2 = \mathbf{a}^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b}^2 = 1 + 2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. $\therefore |\mathbf{a}+\mathbf{b}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$,

设 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 的夹角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{(\mathbf{a}-\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a}+\mathbf{b})}{|\mathbf{a}-\mathbf{b}| \cdot |\mathbf{a}+\mathbf{b}|} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{10}}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

即 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(1) 见模平方, 勿忘开方;

例5. 给定两个长度为1的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$, 它们的夹角为 120° . 如图所示, 点C在以O为圆心的圆弧AB上变动. 若 $\overrightarrow{OC} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $x+y$ 的最大值是_____.

解法一:

$$1 = x^2 + y^2 + 2xy\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x^2 + y^2 + 2xy \times 1 \times 1 \times \cos 120^\circ = x^2 + y^2 - xy = (x+y)^2 - 3xy$$

$$\therefore (x+y)^2 - 1 = 3xy \leq 3\left(\frac{x+y}{2}\right)^2, (x+y)^2 \leq 4, x+y \leq 2$$

当 $x = y$ 时, $x+y$ 取得最大值 2

解法二: 以 O 为坐标原点, 以 OA 为 x 轴正方向建立如图所示的平面直角坐标系

$$\text{设 } \vec{OA} = (1, 0), \vec{OB} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \vec{OC} = (\cos \alpha, \sin \alpha), (0^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ)$$

$$(\cos \alpha, \sin \alpha) = x(1, 0) + y\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(x - \frac{1}{2}y, \frac{\sqrt{3}y}{2}\right)$$

$$\begin{cases} \cos \alpha = x - \frac{1}{2}y \\ \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}y}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \alpha + \cos \alpha \\ y = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \alpha \end{cases}$$

$$x + y = \sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha = 2 \left[(\sin \alpha) \times \frac{\sqrt{3}}{2} + (\cos \alpha) \times \frac{1}{2} \right] = 2 \sin(\alpha + 30^\circ)$$

当 $\alpha = 60^\circ$ 时 $x + y$ 的最大值是 2

- (1) 已知条件如何翻译转化;
- (2) 目标意识;
- (3) 基本不等式;

有了平面向量基本定理, 平面上所有的向量都可以用一组基底表示, 从而使得向量“代数化”, 更为方便. 平面直角坐标系是平面向量基本定理的特殊情况(正交基底), 在这种正交基底的情况下, 向量的运算就转化为坐标运算, 问题因此得到简化;

(选做题) 例 6: 已知 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 是单位向量, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. 若向量 $\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{c} - \mathbf{a} - \mathbf{b}| = 1$,

则 $|\mathbf{c}|$ 的取值范围是

(A) $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1]$	(B) $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+2]$
(C) $[1, \sqrt{2}+1]$	(D) $[1, \sqrt{2}+2]$

解析：依条件及 $|c - (a + b)| = |c - a - b| = 1$ 画出右图.

C 在以 O 为圆心以 1 为半径的圆上

显然当点 C 运动到点 N 时, $|c|$ 取最大值 $\sqrt{2} + 1$;

当点 C 运动到点 M 时, $|c|$ 取最小值 $\sqrt{2} - 1$.

所以 $|c|$ 的取值范围是 $[\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1]$.

故选 A.

(选做题) 例 7. 已知向量 $a \neq e$, $|e| = 1$, 对任意实数 t , 恒有 $|a - te| \geq |a - e|$, 则 ()

- A. $a \perp e$
- B. $a \perp (a - e)$
- C. $e \perp (a - e)$
- D. $(a + e) \perp (a - e)$

解析: EA 是 OB 上的点与点 A 连线中的最短线段, 所以 EA 垂直 OE, 由数到形, 数形结合.

答案: C. $e \perp (a - e)$

三: 课堂小结

1: 知识、方法总结;

2: 基本数学思想

(1) 转化与化归;

(2) 数形结合思想: 向量具有几何和代数双重属性, 解题时要由数想形, 由形到数, 数形结合, 相得益彰.